



¿Cómo es?

Pequeña mata vivaz de porte almohadillado (caméfito pulvinular), con aspecto incluso cespitoso. Posee unos tallos erectos, simples, escaposos pero muy cortos, por lo que no levanta mucho del suelo (2-10 cm). Tienen unas hojitas (7-20 mm) en roseta basal muy densas y apretadas, lineares, rígidas, carinadas, nítidas, enteras y glabras aunque de margen ciliado. Las flores de pétalos amarillos, se observan en racimos de 6 a 20 flores marcadamente contraídos, ebracteados, hermafroditas y tetrámeras, corimbiformes incluso en la fructificación. Las pequeñas flores tienen sépalos de 2 a 4,5 mm erecto-patentes y vilosos; pétalos de 3,5 a 7 mm, obovados, cuneiformes, amarillo limón. Los frutos en silícula latisepta (4,5-9 x 2-4,5 mm), erecto-patentes, elípticos, ovados u oblongo-elípticos, hispídos. Valvas planas o plano-convexas, uninervadas. Estilo de 0,3 a 1,5 mm.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Hoya de Pedraza. Carretera de la Sierra, km 27, Monachil (Granada). Tfno.: 670 945 712 - 697 958 939. Email: jbotanico.pedraza.cagpds@juntadeandalucia.es

HOJAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FLORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRUTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

SE
ENCUENTRA
EN ESTA
ZONA DEL
JARDÍN

¿Dónde crece?

Esta planta es exclusiva de Sierra Nevada, dentro del núcleo silíceo (provincias de Granada y Almería). Vive muy próxima a la subespecie *hispanica*, mucho más extendida (E y S peninsular, llegando al N de África).


¿Dónde podemos encontrarla?


Forma parte de las comunidades de roquedos silíceos (micaesquistos) en el núcleo del macizo de Sierra Nevada, aunque eventualmente se puede encontrar también en pastizales de lugares secos y pedregosos. Aparece en las zonas más altas de la montaña, entre los 2200 - 3400 m, pisos oromediterráneo y crioromediterráneo.

¿Sabías qué?

En aquellas zonas donde habita muy próxima a las poblaciones de su pariente *D. hispanica* Boiss. subsp. *hispanica*, se han detectado individuos con características intermedias, concretamente estilos de 2 mm (carácter determinante de subespecie) que parecen ser introgresiones de ese taxon de poblaciones cercanas. Aunque próximas, ambas tienen una ecología bien diferenciada, siendo la subespecie *hispanica* de roquedos calizos y calizo-dolomíticos.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí 



Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible